

(Continuazione vedi 3.º Fascicolo)

SPECIE.

Gen. LXXXVIII. GALIUM. *Rubiaceæ*. Jus. *Аγχιόπικρον*.

1. G. Bericum. Turra. Sulle rupi di Sisermones. Perenne.
Fior. dal Maggio al Luglio. Fiori bianchi.

2. G. Rotundifolium. Lin. Nelle siepi dovunque. Vivace.
Fior. dal Maggio all'Agosto. Fiori bianchi.

3. G. Witheringii. Sm. Nel Monte Gallisio Inngo i ruscelli. Fiorisce da Agosto a Settembre. Fiori bianchi.
Vivace.

4. G. Aparine. W. Nelle siepi intorno agli orti. Annuale.
Fiorisce dal Maggio all'Agosto. Fiori bianchi, le sue foglie si attaccano agli abiti.

5. G. Saccaratum. Allion. Tra le biade Fiorisce dal Maggio al Luglio, fiori bianchi, annuale.

6. G. Mollugo. W. Ne' terreni del Manducchio limitrofi al Mare, vivace, fiorisce dal Luglio all'Agosto, fiori bianchi.

7. G. Aphyllum. Nob. Nelle vigne di Grevazzula. Pianta di tre piedi, a cauli pieghevoli, aspersi di una polvere cenerognola ruggiadosa, che svanisce al minimo contatto, e che rende la pianta tutta come scintillante al riflesso de' raggi solari. Cauli compressi, quasi tetragoni, rami opposti, alternativamente uno più lungo dell'altro, foglie verticillate da 6-8, appena visibili, armate all'apice di una spina biancastra, ma innocente. Pedunculi terminali, biflori, corolla di un giallo pallido, semi rugosi, didimi, nerastri, fiorisce in Giugno e Luglio. Radici vivaci fibrosissime di un color giallo aranciato, che prende un bel color di porpora con l'azione degli acidi ec.

8. G. Uliginosum. W. Tra le canne del lago di Corizia, vivace, fiorisce dal Luglio all'Agosto, fiori bianchi.

ΕΙΔΟΣ

Γένος LXXXVIII. ΓΑΛΛΙΟΝ Οἶκογ. τῶν Ερυθροδανωδῶν Jus.

1. Γ. Βερικόν. Turra. Ἐπὶ τῶν λιθαίων τῶν Σισερμόνων. Χρόνιον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Λευκανθές.

2. Α. Στρογγυλόφυλλον. L. Εἰς τοὺς ἀπανταχοῦ φραγμούς. Φιλόζων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Λευκανθές.

3. Α. (Βιθερίγγιον.) Sm. Ἐπὶ τοῦ Γαλλισίου ὄρους παρὰ τοὺς ρύακας. Ἀνθεῖ ἀπὸ Αὐγούστου μέχρι Σεπτεμβρίου. Λευκανθές. Φιλόζων.

4. Α. Απαρινειδές. W. Εἰς τοὺς περὶ τοὺς κήπους φραγμούς. Ἐπείτειον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Λευκανθές. Τὰ φύλλα του προσκολλῶνται εἰς τὰ ἐνδύματα.

5. Α. Σακχαρωτόν. Allion. Μεταξὺ τῶν σπαρτῶν. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Λευκανθές. Ἐπείτειον.

6. Α. Μαλακόν. W. Εἰς τὰς παραθαλασσίους γέας τοῦ Μαντουκίου. Φιλόζων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου. Λευκανθές.

7. Α. Αφυλλον. Huet. Εἰς τὰς ἀμπελούς τῆς Κρεβατσούλας. Φυτόν τριποδιαῖον, με εὐκαμπτοὺς καυλοὺς, ἐρραντισμένους με σακτοειδῆ δροσώδη κόνιν, ἥτις ἐξαλείφεται ὑπὸ τῆς ἐλαχίστης συναφῆς τῶν δακτύλων, καὶ διὰ τὴν ὁποῖαν ὅλον τὸ φυτόν φαίνεται σπινθηροβόλον εἰς τὴν ἀντανάκλασιν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. Καυλοὶ συνεστηκότες, σχεδὸν τετράγωνοι· κλάδοι κατάλληλοι, παραλλάξ ὁ εἰς τοῦ ἄλλου μακρότεροι· φύλλα κυκλωτὰ ἐξ ἑως ὀκτῶ, μόλις ὑποπίπτοντα εἰς τὴν ὕαριν, φέροντα ἐπὶ κορυφῆς ἄκανθα ὑπολευκον, ἀβλαβῆ. Κρέμαστρα ληκτικὰ διανθῇ· στεφάνη κιτρίνου καὶ ὠχρᾶς ὀψως· σπέρματα ρυτιδῶδη, δίδυμα, ὑπομέλανα. Ἀνθεῖ τὸν Ιούνιον καὶ Ιούλιον. Ρίζας φιλοζώους, ἰνωδεστάτας, χρώματος κιτρίνου νερανζωτοῦ, τὸ ὁποῖον μεταβάλλεται διὰ τῶν ὀξέων εἰς ὠραῖον πορφυροῦν χρῶμα.

8. Α. Φίλικμον. Μεταξὺ τῶν καλάμων τῆς λίμνης τῶν Κορισίων. Φιλόζων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου. Λευκανθές.

SPECIE

9. *G. Arenarium*. Lois. Nelle arene di acqua dolce a Potamò ed altrove. Fiorisce come sopra, fiori bianchi, annuale.

10. *G. Boreale*. W. Ne' prati intorno alla città. Vivace, fiorisce in Luglio, fiori bianchi.

11. *G. Nitidum*. Thuill. Nelle siepi di *Calefactiones*. Annuale o redivivo da radice perenne? Fiorisce come sopra, fiori bianchi,

12. *G. Græcum*. W. Sulle rupi di Gasturi. Vivace, fiorisce in Luglio ed Agosto. Fiori di un bianco sordido.

13. *G. Erectum*. Huds. Nelle siepi di Lavchi. Vivace, fiorisce come sopra, fiori bianchi.

14. *G. Provinciale*. Lam. Nelle siepi intorno alle vigne di Rodostamo a Castagnà. Annuale, fiorisce come sopra, fiori gialli biancastri.

15. *G. Maritimum*. L. Nelle siepi presso il Mare nei contorni di Ypso, e sulle arene ancora. Annuale, fiorisce in Luglio ed Agosto, fiori bianchi.

16. *G. Verum*. W. Nelle siepi argillose intorno alle fabbriche de' mattoni al Manducchio, ed altrove. Vivace, fiorisce dal Maggio al Luglio, fiori gialli.

17. *G. Palustre*. L. Ne' contorni de' laghi, e ne' fossi di Botumia e di Chrisides, fiorisce in Maggio, Fiori bianchi. Vivace.

18. *G. Murale*. Allion. Sulle mura intorno alla città. Annuale, fiorisce da Maggio a Giugno, fiori bianchi.

19. *G. Purpureum*. L. Nasce tra le biade e su' bordi de' campi coltivati. Annuale, fiorisce come sopra. Fiori di un bianco tendente al carnicino.

20. *G. Tinctorium*. Nob. Pianta di due piedi circa a cauli tetragoni ruvidi al tatto, biancastri, ramosissimi. Foglie da 6-8 lineari alquanto più larghe all'apice che alla base; le inferiori d'ordinario 6, e le radicali 4. spatolate rossiccie; fiori ascellari, sub-sessili alterni con

9. Α. Φίλαμμον. Lois. Εἰς τοὺς ἀρμώδεις τόπους ὅπου ὑπάρχει ποτίμον ὕδωρ, κατὰ τὸν Ποταμὸν καὶ ἀλ-
λαχοῦ. Ἀνθεῖ ὡς τὸ ἀνωτέρω. Λευκανθές. Εὔτετιον.
10. Α. Βόρειον. W. Εἰς τοὺς περὶ τὴν πόλιν λει-
μῶνας. Φιλόζων. Ἀνθεῖ κατὰ Ιούλιον. Λευκανθές.
11. Α. Στιλπνόν. Thuill. Εἰς τοὺς φραγμοὺς τῶν
Καλαφατιῶνων. Εὔτετιον, ἢ παλίμβιον χρονιόρριζον; Ἀνθεῖ
ὡς ἀνωτέρω. Λευκανθές.
12. Α. Γραικικόν. W. Εἰς τῶν λιθάκων τοῦ Γα-
στουρίου. Φιλόζων. Ἀνθεῖ κατὰ Ιούλιον καὶ Αὐγούστον. Ἀνθη
λευκοῦ καὶ ῥυπαροῦ χρώματος.
13. Α. Ορθοφυές. Huds. Εἰς τὰς αἰμασίας τοῦ
Λαυκίου. Φιλόζων. Ἀνθεῖ ὡς ἀνωτέρω. Λευκανθές.
14. Α. Προυίγκιανόν. Lam. Εἰς τὰς περὶ τὰς
ἀμπελούς τοῦ Ροδοστάμμου αἰμασίας, κατὰ τὴν Κασανίαν.
Εὔτετιον. Ἀνθεῖ ὡς ἀνωτέρω. Ἀνθη κίτρινα ὑπόλευκα.
15. Α. Πρόσγειον. L. Εἰς τῶν παρὰ τὴν θάλασσαν
αἰμασιῶν εἰς τὰ πέριξ τοῦ Ὑψου, καὶ ἐπὶ τῆς ἄμμου.
Εὔτετιον. Ἀνθεῖ κατὰ Ιούλιον καὶ Αὐγούστον. Λευκανθές.
16. Α. Αληθές. W. Εἰς τοὺς ἀργιλλώδεις φραγμοὺς
τῶν πλινθουργιῶν εἰς τὸ Μαντούκιον, καὶ ἀλλαχοῦ. Φι-
λόζων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθη κίτρινα.
17. Α. Ελειον. L. Περὶ τὰς λίμνας, καὶ εἰς τοὺς
διώρυγας τῶν Βοτουμιῶν καὶ τῆς Χρυσίδος. Ἀνθεῖ κατὰ
Μάϊον. Λευκανθές. Φιλόζων.
18. Α. Τειχεπίφυτον. Allion. Εἰς τῶν περιτει-
χισμάτων τῆς Πόλεως. Εὔτετιον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις
Ιουνίου. Λευκανθές.
19. Α. Πορφυροῦν. L. Φύεται μεταξὺ τῶν σπαρτῶν
καὶ εἰς τὰς ὄχθας τῶν γεωργημένων ἀγρῶν. Εὔτετιον. Ἀνθεῖ
ὡς ἀνωτέρω. Ἀνθη λευκὰ κρεατοειδῆ.
20. Α. Βαφικόν. Hb. Φυτόν περίπου διποδιαῖον μὲ καυ-
λοὺς τετραγώνους, τραχεῖς τὴν ἀφήν, ὑπολεύκους, πολυκλαδεά-
τους. Φύλλα ἐξ ἑως ὀκτώ, γραμμικά, πλατύτερα ὅπως οὖν πρὸς
τὴν κορυφὴν παρὰ πρὸς τὴν βάσιν. Τὰ κάτω εἶναι συ-
νήθως ἐξ καὶ τὰ ῥιζικά τέσσαρα, σπαθιδωτά, ὑπερύθηρα.
Ἀνθη μασχαλικά, ὑψάμισχα, παραλλαττοντα μὲ φύλλα κυ-

SPECIE

le foglie verticillate, solitarii, piccoli, giallastri. Radici fibrose rossiccio-giallastre che con l'azione degli acidi danno un bel color di lacca. Sarebbe egli il *G. Paschale* di Forskal? Fiorisce dal Maggio al Luglio. Vivace; incontrasi nei boschi di Leucimne, di Arcadades, e di Monte Ercole.

Gen. LXXXIX. CRUCIANELLA. *Rubiaceæ*. Jus.

1. *C. Angustifolia*. W. Sui colli di Sisermones. Annuale; fiorisce dal Giugno, all'Agosto. Fiori a spiga dell'aspetto delle Cereali, concolori.

2. *C. Latifolia*. W. Nei terreni selvatici di Agraphi. Annuale, fiorisce dal Luglio all'Agosto. Fiori della specie antecedente.

Gen. LXC. RUBIA. *Rubiaceæ*. Jus.

Ριζάριον. Σχοινοβάριον. Αγριοβάριον.

1. *R. Tinctorum*. W. Nelle siepi di Sigonò. Vivace. fiorisce dal Giugno al Luglio. Fiori gialli verdastri.

2. *R. Peregrina*. W. Nei terreni selvatici di Epischepsi. Vivace, fiorisce in Luglio. Fiori di un bianco sordido.

3. *R. Micaus*. Nob. Pianta a cauli lunghi, pieghevoli, scandenti, non seabrosa come le specie precedenti; attaccasi però leggermente ai corpi co' quali trovasi a contatto. Cauli quasi tetragoni, alquanto scabrosi in senso inverso. Foglie perenni, ellitiche, a 8 a 8, scabrose al margine i lucide nel disco superiore, inermi nella costa media, panicula assai dilatata, verticillato-dicotoma. Fiori piani unguiculati, rari, quinque-ñdi gialli. Radice grande rossa lungbissima. Vivace, fiorisce dal Maggio all'Agosto. Incontrasi al di la de' mulini di S. Pantaleone entro le siepi, e ne' cespuglj de' boschi. Le radici delle Rubbie sono tutte coloranti, ed usitatissime nell'Arte tintoria. Erano dette dagli antichi, Rize ed *Eritrodano*, e loro attribuivansi

κλωτά. Τὰ ἄνθη ταῦτα εἶναι μεμονωμένα, μικρά, καὶ ὑπε-
κίτρινα. Ρίζαι ἰνώδεις, ὑπέρυθροι ὑποκίτρινοι, αἱ ὁποῖαι
μεταβάλλονται δεὰ τῶν ὀξέων εἰς ὤραιον κόκκινον χρῶμα
(Lacca). Εἶναι ἄραγε τοῦτο τὸ Galium Paschale τοῦ Forskal;
Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Φιλόζων. Ἀσπαντᾷται εἰς
τοὺς δρυμοὺς τῆς Λευκίμνης, τῶν Ορκαδάδων, καὶ τοῦ
Ορους τοῦ Ηρακλείους.

Γένος LXXXIX ΣΚΟΛΟΠΙΟΝ Οἶκογ. τῶν
Ερυθροδανωδῶν.

1. Στενόφυλλον. W. Ἐπὶ τῶν λόφων τῶν Σισερ-
μόνων. Ἐπέτειον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου.
Ἀνθη ἐν εἴδει στάχους ὁμοιομόρφου με τοὺς τῶν δημητρια-
κῶν, καὶ ὁμόχροα.

2. Πλατύφυλλον. W. Εἰς τὰς ἀθεραπεύτους γέας
τῶν Ἀγραφῶν. Ἐπέτειον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγού-
στου. Ἀνθη τα αὐτὰ τοῦ προηγουμένου εἴδους.

Γένος LXC. ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΝ. Οἶκογ. τῶν
Ερυθροδανωδῶν. Jus.

(ΡΙΖΑΡΙΟΝ, ΣΧΟΙΝΟΒΑΦΙΟΝ, καὶ ΛΓΡΙΟΒΑΦΙΟΝ. Κερκ.)

1. Ε. Βαφικόν. W. Εἰς τοὺς φραγμοὺς τοῦ Σιγγοῦ.
Φιλόζων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθη κίτρινα
ὑπόχλωρα.

2. Ε. Πλανόβιον. W. Εἰς τὰς ἀθεραπεύτους γέας
τῆς Ἐπισκέψεως. Φιλόζων. Κατὰ Ιούλιον. Ἀνθη λευκοῦ καὶ
ρुπαροῦ χρώματος.

3. Ε. Λαμπρόν. Hμ. Φυτόν με μακροὺς, εὐκάμ-
πτους, καὶ προσέρφοντας καυλοὺς, ἄνευ τραχύτητος, τῆς
ὁποίας μετέχουσι τὰ προηγούμενα εἶδη. Ἀντέχεται ὅμως
ἀκροθιγῶς τῶν παρακειμένων καὶ συναπτομένων με αὐτὸ
σωμάτων. Καυλοὺς σχεδὸν τετραγώνους, ὅπως οὖν τραχεῖς
ἐξ ἀναστροφῆς φύλλα χρόνια, ἐλλειπτικά, ἀνὰ ὀκτὼ, τραχεῖα
τὴν περιφέρειαν, στυλῶνὰ κατὰ τὸν ἄνω δίσκον, ἄσπλα
κατὰ τὸ μεσώπλευρον. Ἀνθήλην φέρει κατὰ πολὺ ἐκτετα-
μένην, κυκλωτὴν διγύτομον. Ἀνθη λεῖα, ὀνυχωτά, ἀραιά, πεν-
τασχιδῆ κίτρινα. Ρίζαν εὐμεγέθη, ἐρυθρὰν, μακροτάτην,
φιλόζων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Ἀσπαντᾷται

SPECIE

delle facoltà medicinali meravigliose , essendo decantate come Diuretiche , emmenagoghe ec. ec. Oggidì non sono più in uso.

Gen. LXCI. EXACUM. *Gentianeae*. Jus.

1. E. Filiforme. W. Ne' prati intorno al lago di Staryopotamo. Annuale. fiorisce dal Maggio al Luglio, fiori gialli.

Gen. LXCH. PLANTAGO. *Plantagineae*. Jus.

1. P. Subulata. L. Sulle sponde del fiume di Potamò presso il Ponte Nuovo verso il mare. Fiorisce dal Maggio al Luglio , fiori in spiga erbacei , poco differenti trà loro in tutte le congeneri , perchè varianti solo nella grandezza. Vivace.

2. P. Major. W. Ne' terreni umidi , come ne' controfossi della città , sulle sponde degli orti ec. Fiorisce dal Maggio al Giugno, fiori erbacei con antere bianche. Vivace.

3. P. Dentata. Varietà prima della specie precedente , a foglie dentellate. Nasce promiscuamente con essa , e fiorisce contemporaneamente.

4. P. Minor. Varietà seconda della specie suddetta a foglie più piccole , nasce e fiorisce come la prima varietà.

5. P. Polystachia. Varietà terza , della specie istessa a spiga bifida o multifida. Nasce promiscuamente col suo Prototipo . cioè con la specie N.º 2 , e fiorisce contemporaneamente alle citate varietà.

6. P. Media. W. Ne' prati intorno alla città. Fiorisce dal Maggio al Luglio , fiori erbacei. Vivace.

7. P. Altissima. W. Ne' fossi intorno la città. Fiorisce dal Giugno al Luglio , fiori erbacei. Vivace.

εἰς τοὺς ἐπέκεινα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀνεμομύλους
ἔνδον τῶν φραγμῶν, καὶ τῶν θαμνίσκων τῶν δαπέων.

Αἱ ῥίζαι τῶν Ερυθροδάνων εἶναι ὅλαι χρωματιστικαὶ καὶ
χρησιμότεται εἰς τὴν Βαφικὴν. Ἐκαλοῦντο ἀπὸ τοὺς ἀρ-
χαίους Ρίζαι καὶ Ερυθρόδανα. Ἀπέδιδον εἰς αὐτὰ δυνάμεις
ιατρικὰς θαυμασίας καὶ τὰ ἐφήμιζον ὡς διουρητικὰ, ἐμ-
μηναγωγὰ κτλ. σήμερον ὅμως δὲν εἶναι πλέον εἰς χρῆσιν.

Γένος LXCI. ΕΞΑΓΟΝ. Οἶκος. τῶν Γεντιανωδῶν.

1. Νηματοειδές. W. Εἰς τοὺς περὶ τὴν λίμνην τοῦ
Σταυροποτάμου λειμῶνας. Ἐπέτειον. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέ-
χρις Ιουλίου. Ἀνθὴ κίτρινα.

Γένος LXCII. ἈΡΝΟΓΛΩΣΣΙΟΝ. Οἶκος. τῶν

Ἀρνογλωσσωδῶν. Jus.

1. Α. Ρομφεωτόν. L. Ἐπὶ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ
εἰς τὸ Προάστειον τὸ καλούμενον Ποταμός παρὰ τὴν νεο-
παγὴ γέφυραν πρὸς τὴν θάλασσαν. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέχρις
Ιουλίου. Ἀνθὴ σταχυωτὰ ποώδη, ὀλίγον διαφέροντα μεταξὺ των
καθ' ὅλα τὰ συγγενῆ φυτὰ, ἐπειδὴ παραλλάττουσι μόνον
κατὰ τὸ μέγεθος. Φιλόζων.

2. Α. Μεῖζον. W. Εἰς τὰς καθύγρους γέας, καθὼς
καὶ εἰς τὰ περιχαρὰ κώματα τῆς πόλεως, ἐπὶ τὰς ὄχθας
τῶν κήπων κτλ. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου. Ἀνθὴ
ποώδη ἔχοντα λευκοὺς κονιούχους. Φιλόζων.

3. Α. Ὀδοντωτόν. Πρώτη ποικιλία τοῦ προηγουμένου
εἶδους με ὀδοντιωτὰ φύλλα. Φύεται ἀνάμεμιγμένως με αὐτὴν
καὶ συνανθεὶ ταυτοχρόνως.

4. Α. Ελαττόν. Δευτέρα ποικιλία τοῦ εἰρημένου εἶδους
με μικρότερα φύλλα. Φύεται καὶ ἀνθεὶ ὡς ἡ πρώτη ποικιλία.

5. Α. Πολύσυχυ. Τρίτη ποικιλία τοῦ αὐτοῦ εἶδους
με δισχιδῆ, ἢ πολυσχιδῆ στάχυν. Φύεται ἀνάμεμιγμένως με
τὸ πρωτότυπον, ἤγουν με τὸ δεύτερον εἶδος, καὶ συνανθεὶ
ταυτοχρόνως με τὰς προτεθείσας ποικιλίας.

6. Α. Μεσαῖον. W. Εἰς τοὺς περὶ τὴν πόλιν λειμῶ-
νας. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ ποώδη. Φιλόζων.

7. Α. Υψιπορώτατον. W. Εἰς τοὺς περὶ τὴν πόλιν
διώρυγας. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ ποώδη.
Φιλόζων.

SPECIE

8. *P. Lancedata*. W. Πεντάνευρον. Nelle colline di Capsochilades. Fiorisce dal Maggio al Luglio. Corolle fosche tendenti al bianco. Vivace.
9. *P. Minor*, Αρνόγλωσσον Varietà prima, della precedente a foglie più piccole.
10. *P. Trinervis*. Varietà seconda della stessa a foglie strettissime con 3 nervi, invece di cinque comuni alle foglie del Prototipo.
11. *P. Hirsuta*. Varietà terza, della stessa a foglie irsute.
12. *P. Longiscapa*. Varietà quarta della stessa con la sommità dello scapo d' assai più lungo di quello del Prototipo, e delle tre antecedenti varietà, fornito di foglie.
13. *P. Lagopus*. W. Ne' terreni sterili di Raftades. Fiorisce dal Giugno al Luglio, fiori erbacei. Vivace.
14. *P. Bellardi*. W. Ne' terreni sterili di Sgurades. Fiorisce come sopra, fiori giallastri. Vivace.
15. *P. Maritima*. W. Su i lidi Boreali dovunque e specialmente sotto Spagus, ed Afiona. Fiorisce in Luglio. Antere gialle. Vivace.
16. *P. Serraria*. W. Σπληνόχορτον. Comunissima in tutte le praterie ne' contorni della città, e lungo le strade. Fiorisce dal Giugno al Luglio, fiori erbacei. Vivace.
17. *P. Arenaria*. P. S. Ne' terreni arenosi di Paleocastrizza. Fiorisce dal Maggio all' Agosto, fiori erbacei. Annuale.
18. *P. Coronopus*. W. Ψαλιδάκιον. Ne' terreni glareosi lungo le strade. Fiorisce da Aprile a Settembre, fiori erbacei. Annuale.
19. *P. Hirsuta*. Varietà della precedente a spighe irsute biancheggianti.
20. *P. Jacquini*. R. S. Ne' terreni glareosi di Armenades. Fiorisce dal Maggio al Luglio, fiori erbacei. Annuale.
21. *P. Psyllium*. W. Incontrasi dovunque sulle macerie,

8. Α. Λογχωτόν. W. PENTANEYRON. Εἰς τοὺς λόφους τῶν Κοφοχειλάδων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Στεφαναὶ ἀμαυραὶ τείνουσαι πρὸς τὸ λευκόν. Φιλόζων.

9. Α. Ελαττον. ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ. Πρώτη ποικιλία τοῦ προηγουμένου εἶδους μὲ μικρότερα φύλλα.

10. Α. Τρίνευρον. Δευτέρα τοῦ αὐτοῦ ποικιλία μὲ φύλλα στενώτατα τρίνευρα ἀντὶ πενταεύρων, ὡς εἶναι τὰ τοῦ πρωτοτύπου.

11. Α. Δασύ. Τρίτη τοῦ αὐτοῦ ποικιλία μὲ φύλλα δασέα.

12. Α. Μακρόσκαπον Τετάρτη τοῦ αὐτοῦ ποικιλία ἔχουσα τὴν κορυφὴν τοῦ σκάπου πολὺ μακροτέραν τῆς τοῦ πρωτοτύπου καὶ τῶν τριῶν προηγουμένων ποικιλιῶν, καὶ φυλλοφόρον.

13. Α. Λαγόπουν. W. Εἰς τὰς ἀγόνους γέας τῶν Ρακτάδω. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ ποώδη. Φιλόζων.

14. Α. (Βελλάρδιον) W. Εἰς τὰς ἀφύρους γέας τῶν Σγουράδων. Ἀνθεῖ ὡς ἀνωτέρω. Ἀνθὴ ὑποκίτρινα. Φιλόζων.

15. Α. Πρόσγειον. W. Ἐπὶ τῶν προσβορείων αἰγιαλῶν ἀπανταχοῦ, ἐξαίρετως δὲ ὑπὸ τοὺς Σπάργους καὶ τὸν Αφιδῶνα. Ἀνθεῖ κατὰ Ιούλιον. Κονιοῦχοι κίτρινοι. Φιλόζων.

16. Α. Πριονωτόν. W. ΣΠΑΙΝΟΧΟΡΤΟΝ. Κερ. Κοινότατον εἰς ὅλους τοὺς περὶ τὴν πόλιν λειμῶνας, καὶ παρὰ τὰς ὁδούς. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ ποώδη. Φιλόζων.

17. Α. Φίλαμμον. P. S. Εἰς τὰς ἀμμώδεις γέας τῆς Παλαιοκαστρίτσας. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθὴ ποώδη. Ἐπέτειον.

18. Α. Κορονόπουν. W. ΨΑΛΙΔΑΚΙΟΝ. Εἰς τὰς ψαμμώδεις γέας παρὰ τὰς ὁδούς. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρι Σεπτεμβρίου. Ἀνθὴ ποώδη. Ἐπέτειον.

19. Α. Δασύ. Ποικιλία τοῦ προηγουμένου εἶδους μὲ στάχυς δασεῖς καὶ ὑπολεύχους.

20. Α. (Ιακκύνειον) R. S. Εἰς τὰς ψαμμώδεις γέας τῶν Ἀρμενάδων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ ποώδη. Ἐπέτειον.

21. Α. Ψύλλιον. W. Ἀπαντᾷ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων ἀπανταχοῦ, καὶ τῶν παλαιῶν τῆς Πόλεως τευχῶν. Ἀνθεῖ

SPECIE

e sulle vecchie mura della città. Fiorisce dall' Aprile al Giugno. Pianta ramosa, fiori erbacei. Annuale.

22. *P. Cynops*. W. Con la precedente dalla quale non differisce che nella consistenza, e nel portamento ordinario, essendo la prima erbacea e questa suffruticosa; quella a foglie sub-dentate recurve, questa a foglie filiformi intatte; quella a caule eretto, questa a caule reptante. Del resto allorchè nasce in siti erbosi, difficilmente distinguesi dalla prima, nè richiedesi che l'occhio esercitato del Botanico. Fiori, ed epoca della fioritura idem. Annuale.

23. *P. Nutaus*. P. S. Ne' terreni sterili dovunque. Fiorisce dal Maggio al Luglio, fiori erbacei. Vivace.

24. *P. Pilosa*. P. S. Ne' monti di Sgurades. Fiorisce come sopra. Vivace.

25. *P. Lusitanica*. L. Ne' terreni sub-maritimi di Santa Catterina di Ghiro, Fiorisce dal Luglio all'Agosto, fiori bianchi. Vivace.

26. *P. Pulla*. Nob. Erbacea. Scapo brevissimo di un pollice al più. Foglie disposte in rosa. Pubescenti, lineari dentate all' indietro, o piuttosto runcinate aderenti al suolo, al numero di 8-12. Scapo solitario pubescente. Spica ovoidale lanata. La base dei Pezioli aderenti alla radice involuppati di una folta e tenera lanugine di color laterizio languido. Nasce ne' prati aprici de' monti di Sisermones. Fiorisce in Maggio. Non è l' autore sicuro se sia vivace, o si riproduca da radici vivaci? Varie specie di piantaggine sono tuttora in uso in medicina, ed il loro credito ascende alla più remota antichità. Le specie N.º 2, 4, 6, 8 e 9 sono refrigeranti, e si fa uso dell'acqua delle foglie distillata. La specie N.º 21 è Diuretica, ed i suoi semi mucillaginosi sono catartici.

ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις Ιουνίου. Φυτόν πολύκλαδον. Ἀνθή ποώδη. Εστέτιον.

22. **A. Κυνοποειδές.** W. Φύεται ὁμοῦ μὲ τὸ προηγούμενον, ἀπὸ τὸ ὅποσον δὲν διαφέρει εἰμὴ κατὰ τὴν διαρκειαν καὶ τὴν κοινὴν μορφήν. Ἐπειδὴ τὸ πρῶτον εἶναι ποώδες καὶ αὐτὸ φρυγανῶδες, τὸ μὲν φέρει ὑποδοντωτὰ ἐπικαμπῆ φύλλα, τὸ δὲ νηματοειδῆ ἀνέσπαφα· ἐκεῖνο ὀρθοφυῆς καὶ αὐτὸ ἐπιγείαυλον. Φύεται δὲ εἰς βοτανῶδεις τόπους καὶ δυσκόλως διακρίνεται κατὰ πρῶτον, ὥς ἀπαιτεῖται διὰ τοῦτο τὸ ἐξησκημένον ὄμμα τοῦ βοτανικοῦ. Ἀνθὴ καὶ ἐσχὴ τῆς ἀνθηφορίας, ὡς ἀνωτέρω. Εστέτιον.

23. **A. Κυματίζον.** P. S. Εἰς τὰς ἀφόρους γέας ἀπανταχοῦ. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ ποώδη. Φιλόζων.

24. **A. Χνοῶδες.** P. S. Ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν Σγουράδων. Ἀνθεῖ ὡς ἀνωτέρω. Φιλόζων.

25. **A. Λυσιτανικόν.** L. Εἰς τοὺς παραθαλάσσιους ἀγροὺς τῆς Ἀγ. Αἰκαταιρίνης τῶν Γύρου. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου. Δεικανθές. Εστέτιον.

26. **A. Μικρόν.** Hμ. Ποῶδες. Σκάπος βραχύτατος, τὸ πλείονον δακτυλιαῖος. Φύλλα τεταγμένα κατὰ ῥόδον, ἡβίζοντα, γραμμῶδη, ὀδοντωτὰ ὀπισθεν, ἢ μάλλον δρεπανοσχιδῆ. Ἐπίγεια, ὀκτὼ ἕως δώδεκα τὸν ἀριθμὸν. Σκάπος μεμονωμένος ἡβίζων. Στάχυς ὠσειδῆς ἐριοφόρος. Ἡ βᾶσις τῶν μίσχων προσφύτων ἐπὶ τῆς ῥίζης, περικαλυμμένων ἀπὸ τι ἐριῶδες πυκνὸν καὶ τρυφερόν, χρώματος κεραμοειδοῦς ἀπηνθημένου. Γεννᾶται εἰς τοὺς προσηλίους λευμῶνας τῶν ὀρέων τῶν Σισερμώνων. Ἀνθεῖ κατὰ Μαΐον. Δὲν εἶναι βέβαιος ὁ Συγγραφεὺς ἂν ἦναι φιλόζων, ἢ ἀναλαμβάνη ἀπὸ ῥιζῶν φιλοζων.

Πολλὰ εἶδη Ἀρνογλώσσων εἶναι ὁλονὲν χρήσιμα εἰς τὴν Ἱατρικὴν, καὶ εὐφημίζονται ἐξ αὐτῆς τῆς ἀμνημονεύτου ἀρχαιότητος. Τὰ εἶδη ὑπ' ἀριθ. 2, 4, 6, 8, 9, εἶναι καταψυκτικά, καὶ μεταταχειρίζονται τὸν ὅπὸν τῶν φύλλων τῶν διυλιζόμενον. Τὸ δὲ ὑπ' ἀριθ. 21, εἶναι διουρητικόν, καὶ τὰ γλοιῶδη του σπέρματα ἐνεργητικά.

SPECIE

Gen. LXCIII. CENTUNCULUS. *Primulacæ*. B. P.

1. C. Minimus. W. Ne' terreni arenosi presso il Fiume Tiflò a Sidari. Fiorisce dal Giugno al Luglio, fiori bianchi. Annuale.

Gen. LXCIV. SANGUISORBA. *Rosacæ*. Jus.

1. S. Officinalis. W. Αἰματόχορον. Ne' prati di Sfraida. Fiorisce dal Maggio all'Agosto, fiori sanguigni. Vivace.

Gen. LXCIV. CORNUS. *Caprifoliacæ*. Jus.

1. C. Sanguinea. W. Ριθόδεσπον. Ne' boschi di Velondes. Fiorisce da Novembre a Dicembre, fiori bianchi. Vivace.

Gen. LXCVI. ISNARDIA. *Onograriæ*. Jus.

1. I. Palustris. W. Ne' canneti sulle sponde del Lago di Stavropotamo. Fiorisce in Luglio, fiori color di Pistachio. Annuale.

Gen. LXCVII. ELÆAGNUS. *Elæagneæ*. Jus.

1. E. Angustifolia. W. Nelle siepi di Valle di Ropa. Fiorisce dal Giugno al Luglio, fiori gialli. Vivace.

Gen. LXCVIII. BUFONIA. *Juncæ*. Jus.

1. B. Annua. L. Ne' prati umidi di Botumia. Fiorisce dal Marzo al Maggio, fiori erbacei. Annuale. Ha l'aspetto dell' *Juncus Bufonius*.

2. B. Tenuifolia. W. Ne' viali de' Giardini, e ne' siti umidi ombrosi, come ne' viali del Giardino del Governo a San Pantaleone sotto gli ulivi. Fiorisce dall'Aprile al Maggio; fiori come sopra. Annuale.

Ordine II.º *Digynia*. Due Pistilli.

Gen. LXCIX. HYPECOUM. *Papaveracæ*. Jus.

1. H. Littorale. Jacq. Sommerso nelle arene del Mare a Paleo-Castrizza ed a Porto Timone. Fiorisce dal Maggio

Γένος LXCHH ΑΝΑΦΑΛΙΣ.

1. Ε. Ελάχισον. W. Εἰς τὰς ἀμμόδεις γέας παρὰ τὸν Τυφλοπόταμον εἰς τὸ Σιδάρι. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Λευκανθές. Επέτειον.

Γένος LXCIV ΣΙΔΗΡΙΤΙΣ. Οἶκογ. τῶν Ροδωδῶν. Jus.

1. Αἰ Φαρμακικόν, W. ΑΙΜΑΤΟΧΟΡΤΟΝ. Εἰς τοὺς λειμῶνας τοῦ Σφραϊδα. Φιλόζων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθη αἱματοειδῆ.

Γένος LXCv. ΚΡΑΝΕΙΑ.

1. Κ. Αἱματόχρους. W. ΡΟΔΟΔΕΝΔΡΟΝ. Εἰς τοὺς δρυμοὺς τῶν Βελονάδων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Νοεμβρίου μέχρις Δεκεμβρίου. Λευκανθές. Φιλόζωος.

Γένος LXCVI. ΙΣΝΑΡΔΕΙΑ.

1. Ι. Ελειος. W. Εἰς τοὺς καλαμῶνας ἐπὶ τὰς ὄχθας τῆς λίμνης τοῦ Σταυροποτάμου. Ἀνθεῖ κατὰ Ιούλιον. Ἀνθη τοῦ χρώματος τοῦ Πισακίου. Επέτειον.

Γένος LXCvII. ΕΛΛΙΑΓΝΟΣ. Οἶκογ. τῶν Ελαιαγνώδων Jus.

1. Ε. Στενόφυλλος. W. Εἰς τὰς αἱμασίας τοῦ Λεβαδίου τοῦ Ρόπα. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Λευκανθές. Φιλόζωος.

Γένος LXCvIII. ΒΟΥΦΩΝΕΙΑ. Οἶκογ. τῶν Σχινωδῶν Jus.

1. Β. Επέτειος. W. L. Εἰς τοὺς καθύγρους λειμῶνας τῶν Βοτουμίων. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαρτίου μέχρις Μαΐου. Ἀνθη ποώδη. Επέτειος. Ἐχει μορφὴν τοῦ *Juncus Bufonius*.

2. Β. Λεωτόφυλλος. W. Κατὰ τὰς διόδους τῶν κήπων, εἰς ὑγροὺς καὶ σκιερούς τόπους, καθὼς καὶ εἰς τὰς διόδους τοῦ Κήπου τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὸν Ἀγ. Παντελεήμονα ὑπὸ τὰς Ελαίας. Ἀνθεῖ ἀπὸ Απριλίου μέχρις Μαΐου. Ἀνθη, ὡς ἀνωτέρω. Επέτειος.

Τάξις Β'. Διγυνία (Διῦπερος)

Γένος LXCIX. ΥΠΗΧΟΟΝ. Οἶκογ. τῶν Μηκωνῶδων. Jus.

1. Υ. Λιγιάλιον. *Jaeg.* Κατάδυτον εἰς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης κατὰ τὴν Παλαιοκασρίτσαν καὶ Πορτοτιμῶ-

SPECIE

al Giugno, fiori gialli aranciati. Annuale. Egli è appena visibile sulle arene, ond' è che difficilmente è reperibile, se non che nell' epoca della fioritura, mentre in allora i suoi fiorellini veggionsi ad intervalli sollevar la testa sulla superficie delle arene, trovandosi le foglie coperte dalle medesime.

Ordine III.^o (a) *Tetragynia*. Quattro Pistilli.

Gen. C. POTAMOGETON. *Alismaceæ*. Jus.

1. P. *Heterophyllum*. W. Ne' laghi di S. Onufrio, di Valle di Ropa, di Santa Catterina a Ghiro, di Corizia ec. Vivace. Fiorisce in Agosto, fiori a spiga, hialini.

2. P. *Natans*. W. Ne' laghi suddetti, come ne' fossi di Botumia, di Crisida, e di Calcuna. Vivace. Fioritura e fiori come sopra. Fù questa specie osservata alla sorgente di Chrisida dal D.^r Botta, conforme risulta dalla sua Storia Naturale e Medica di Corfù, e tuttora vi vegeta in abbondanza.

3. P. *Pectinatum*. L. Nei laghi anzidetti insieme con le descritte, e con le specie che seguono, alle quali somigliano nell' Inflorescenza, come convengono nella durata, e nell' epoca dell'Antesi.

4. P. *Lanceolatum*. Varietà che s' incontra ne' fossi di Chrisida, a foglie lanceolate bislunghe; egli è, come opina l'Autore, un Ibridismo della specie seconda.

5. P. *Pusillum*. L. Ne' laghi suddetti.

6. P. *Fluitans*. W. Come sopra ec., e specialmente agli Scolì del Lago di Stavropotamo.

(a) Non ha luogo a formalizzarsi chiunque osservasse con occhio critico il passaggio dalla *Digynia* alla *Tetragynia*, conservandosi sempre l'ordine progressivo ne' numeri; questo salto è ad ogni momento ovvio nelle classi, ove non vi hanno fiori che ci offrano un numero progressivo di Pistilli. In questa classe per Es.^o non vi hanno fiori a tre Pistilli.

νιον. Ανθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου. Ανθη κίτρινα νε-
ραλῶτά. Εὐτέριον. Μόλις φαίνεται ἐπ'άνωθεν τῆς ἄμμου,
διὰ τοῦτο εἶναι δυσέρετον πρὸ τῆς τῆς ἀνθηφορίας,
ἐπειδὴ τότε τὰ ἀνθήλια του ἀρχίζουν ἐκ διαλειμμάτων
νὰ ἀνεγείρονται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς ἄμμου, ἢ
ὅποια σκεπάζει τὰ φύλλα των.

* Τάξις Γ'. Τετραγυμία (Τεθρύπερος)

Γένος C. ΠΟΤΑΜΟΓΕΙΤΩΝ. Οἰκογ. τῶν Ἀλισματωδῶν Jus,

1. Π. Ετερόφυλλος. W. Εἰς τὰς λίμνας τοῦ Ἀγ.
Ονουφρίου, τοῦ Λιβαδίου τοῦ Ρόπα, τῆς Ἀγ. Αἰκατερί-
νης εἰς τὰ Γύρου, τῶν Κορισίων, κτλ. Φιλόζωος. Ανθεῖ
κατ' Ἀγύρουσιν. Ανθη σαχυρτά ὑάλινα.

2. Π. Επινέων. W. Εἰς τὰς εἰρημέναις λίμνας,
καθὼς καὶ εἰς τοὺς διώρυγας τῶν Βοτουμίων, τῆς Χρυ-
σίδος, καὶ Καλκούνα. Φιλόζωος. Ανθη καὶ ἀνθηφορία, ὡς
ἀνωτέρω. Παρατηρήθη τὸ εἶδος τοῦτο εἰς τὴν πηγὴν τῆς
Χρυσίδος ἀπὸ τὸν Δοκ. Βότταν, ὡς ἐξάγεται ἀπὸ τὴν
Φυσικὴν καὶ Ιατρικὴν του Ἰσორίαν τῆς Κερκυρας καὶ ἀκόμη
εὐθηνεῖ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος.

3. Π. Κτενωτός. L. Εἰς τὰς προειρημέναις λίμνας
φύεται ὁμοῦ μὲ τὰ περιγραφέντα καὶ τὰ ἐσόμενα εἶδη,
μὲ τὰ ὅποια ὁμοιάζουν κατὰ τὴν ἀνθηφορίαν, καὶ συμφω-
νοῦσιν ὡσαύτως κατὰ τὴν διάρκειαν καὶ τὴν ἐποχὴν τῆς
ἀνθηφορίας.

4. Π. Λογχωτός. Ποικιλία ἀπαντωμένη εἰς τοὺς
διώρυγας τῆς Χρυσίδος, μὲ φύλλα λογχώδη ἐπιμήκη. Τὸ
εἶδος τοῦτο εἶναι κατὰ τὴν γνώμην τοῦ Συγγραφέως ἐκνό-
θευσις τοῦ δευτέρου.

5. Π. Μικροφυής. L. Εἰς τὰς διαληφθεῖσας λίμνας.

6. Π. Κυμαινόμενος. W. Ὡς ἀνωτέρω, κτλ. ἐξαι-
ρέτως δὲ εἰς τὰ ρεύματα τῆς λίμνης τοῦ Σταυροποτάμου.

* Πρέπει ἀπορρίψει τις παρατηρῶν μὲ κριτικὴν ὀφθαλμὴν τὴν μετάβασιν
ἀπὸ τῆς Ἀγρυΐας εἰς τὴν Τετραγυμίαν, ἐνῶ φυλάττεται πάντοτε ἡ τά-
ξις τῆς ἀριθμητικῆς προόδου. Αὐτὴ τι πᾶν ἔργον γίνεται συχνάκις εἰς τὰς
Κλασεις, ὅπου δὲ ὑπάρχουν ἀνθη θινάμενα νὰ συμπληρώσῃσι προδεκτικῶς
τὸν ἀριθμὸν τῶν ὑπέρων. Εἰς τὴν κλάσιν ταύτην π. γ. δὲν ὑπάρχουν
ἀνθη Τριόπερα.

7. *P. Crispum*. W. Nei laghi suddetti e specialmente nel lago maggiore di S. Onufrio. Le sue foglie restano sempre deformate da quella sostanza Calcarei, dalla quale risultano le Stalattiti ne' Stillicidii sotterranei, trovandosene sempre investite, così che è difficile di ottenere un saggio perfetto per conservare negli erbarii. Non sa l'Autore render ragione per qual ignota forza simpatica questo deposito o secrezione delle acque investa le foglie di questa specie esclusivamente, e non quelle di tante altre Najadi che vegetano con essa gregariamente?

8. *P. Compressum*. W. Nel lago di Cavrolimi specialmente. Fiorisce in Giugno e Luglio. Spiga albeggiante.

9. *P. Gramineum*. W. Ne' fossi di Castrades limitrofi alle Saline distrutte, comunissimo, fiorisce dal Luglio all' Agosto.

10. *P. Lucens*. W. Nel lago specialmente di Valle di Ropa. Fiorisce dal Giugno al Luglio. Spighe verdastre.

11. *P. Annulatum*. Bellardi. Nel lago di Santa Caterina di Ghiro. Fiorisce come sopra.

12. *P. Hybridum*. Thuill. Nel lago di Corizia, fiorisce come sopra.

13. *P. Setaceum*. Nob. Foglie capillari semplici, e non distiche come nella specie N.º 3. con la quale si confonde a prima vista; Sommerse, sessili, lunghissime. Caule rammosissimo, piano come nella specie N.º 10. Vagine bianche. Stipule lunghe verdastre. Spighe cilindriche, ascellari, fornite di lunghi pedunculi. Ne' fossi Sub-marini contigui al Torrente di Tiflò, e negli altri tutti intorno Sidari, però sempre in vicinanza del Mare, comunissimo. Fiorisce dal Giugno all'Agosto, come tutte le altre specie vivace.

Gen. CI. RUPPIA: *Alismaceæ*. Jus.

1. *R. Maritima*. W. Ne' fossi lungo le strade dalla parte

7. Ο ύλος. W. Εἰς τὰς εἰρημένους λίμνας, καὶ κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν μαγαλητέραν τοῦ Αγ. Ονουφρίου. Τὰ φύλλα του πάντοτε ἀπομορφοῦνται ἐκ τῆς τιτανώδους ὑποστάσεως ἥτις ἀποτελεῖ τοὺς γαλακτίτας εἰς τὰ ὑπόγεια γαλακτῆρια, ὥστε διὰ εἶναι πάντοτε περικαλυμμένα, ὥς ἐν σκόλῳ ἐμπορεῖ τις νὰ λάβῃ ἐντελὲς δοκίμιον διὰ νὰ τὸ φυλάξῃ εἰς τὸ Βοτανολόγιον. Ο συγγραφεὺς δὲν ἐξεύρει νὰ εἴπῃ δι' ὁποίας ἀγνώστου συμπαθητικῆς δυνάμεως, αὐτὸ τὸ ἀπόστημα (κατακαθισμα), ἢ ἡ ἔκκρισις τῶν ὑδάτων περιβαλλεῖ τὰ φύλλα τοῦ εἶδους τούτου κατ' ἐξαίρεσιν, καὶ ὅχι τὰ τῶν συμπααραφωμένων πολυαριθμῶν Ναιάδων, αἵτινες συμφύονται ἀθρόως.

8. Π. Συνεσπικώς. W. Εἰς τὴν Καβουρόλμνην κατ' ἐξοχὴν. Ἀνθεὶ κατὰ Ιούνιον καὶ Ιούλιον Στάχυς λευκοειδής.

9. Π. Αἰρωσιώδης. W. Εἰς τοὺς διώρυγας τῆς Γαρίτσας συνορεύοντας μὲ τὰ ξηραθέντα ἀλοπῆγισα, κοινότατος. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

10. Π. Σπιλινός. W. Κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν λίμνην τοῦ λιβαδίου τοῦ Ρόπα. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Στάχυς ὑπόχλωροι.

11. Π. Κρικωτός. Bel. Εἰς τὴν λίμνην τῆς Αγ. Αἰκαταρινῆς εἰς τὰ Γύρου. Ἀνθεὶ, ὡς ἀνωτέρω.

12. Π. Νόθος. Thuill. Εἰς τὴν λίμνην τῶν Κορισίων Ἀνθεὶ, ὡς ἀνωτέρω.

13. Π. Τριχώδης. Hm. Φύλλα τριχώδη ἀπλᾶ, καὶ ὅχι δίσιχα ὡς εἰς τὸ ὑπ' ἀρ. 3. Εἶδος, μὲ τὸ ὅποιον συγγέται ἐκ πρώτης ὀψεως. Εἶναι δὲ κατὰ δοκίμιον, ἄμισχα, καὶ μακρότατα. Καυλὸς πολυκλαδώτατος, λείος καθὼς τὸ εἶδος ὑπ' ἀρ. 10. Κολοὶ λευκοί, παραφυλλίδες μακροὶ ὑπόχλωροι. Στάχυς κυλινδρικοί, μασχαλικοί, φέροντες μακρὰ κρέμασρα. Εἰς τοὺς παραθαλασσίους διώρυγας, πλησίον τοῦ Τυφλοποτάμου, καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς περὶ τὸ Σιδάριον, πάντοτε ὅμως ἐγγὺς τῆς θαλάσσης. Κοινότατος. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου, καθὼς ὅλα τὰ ἄλλα εἶδη. Φιλόζωος.

Γένος CI. ΡΟΥΠΗΙΑ. Οἶκογ. τῶν Αἰσματωδῶν Jus.

1. Ρ. Πρόσγειος. W. Εἰς τοὺς διώρυγας πρὸς τὸ

SPECIE

delle Saline di Potamò, passato il Ponte Nuovo, frequentissima. Fiorisce in Luglio, fiori apetalì. Vivace.

Gen. CII. SAGINA. *Caryophyllæ*. Jus.

1. S. Apetala. W. Sopra le vecchie mura della Città, nelle piazze, e nelle strade alquanto ombreggiate dovunque. Fiorisce dal Marzo al Maggio. Vivace. Fiori apetalì. Pianta piccolissima, che calpestasi di continuo, senza che cada sott'occhio.

Gen. CIII. TILLÆA. *Sempervivæ* Jus.

1. T. Muscosa. W. Tra i Muschi al Nord del Monte di S. Salvatore. Fiorisce dal Giugno all' Ottobre. Fiori erbacei. Pianta niente maggiore della *Sagina* sopra citata. (a)

Classe V. *Pentandria*. Cinque Stami.

Ordine I.^o *Monogynia*. Un Pistillo.

Genere CIV. MYOSOTIS. *Borragineæ*. Jus.

1. M. Scorpioides. W. Sulle sponde de' fossi erbosi alle Straute, e sulle rupi del Monte di Abramo, davanti al giardino del Sig. Vrachioti. Fiorisce da Aprile ad Agosto, fiori cerulei con l'ombelico giallo. Annuale.

(a) Se esistesse sulla superficie dell' Isola; e se atteso il clima ed il suolo della stessa, potesse vegetarvi senza soccorso dell'arte, sarebbe all'ordine di questa classe ove dovrebbe riportarsi. *Ilex Aquifolium* riferito dal defunto D.^r Michele Pieri nelle sue tre Centurie della Flora Corcirese data alla luce nel 1814. pagina 21. col Sinonimo *Πριβάριον ἀκκυσόφυλλον*, e dal prelodato D.^r Botta nella sua Storia ec., testè citata dell' Isoia di Corfù col Sinonimo *Primari*, col quale, egli asserisce, lo distinguono gli abitanti dell' Isola. Vedi la citata opera Ede di Milano 1823. pagina 20. Giudica l'Autore senza tema di equivocare, che l'uno e l'altro de' prelodati autori abbiano per tale caratterizzata o la Querce Leccio, (*Quercus Ilex*. L.) o la specie *Q. Pseudo Cocifera* L. ambedue somigliantissime all' Aquifoglio, e facili a confondersi col medesimo, ove si osservino avanti l'epoca dell'infiorescenza.

μέρος τῶν Αλοπηγίων τοῦ Ποταμοῦ, ἐπείκεινα τῆς νεοσφύρος γεφύρας. Συχνώτατος. Ἀνθεὶ κατὰ Ιούλιον. Ἀνθὴ ἀπέ-
ταλα. Φιλόζωος.

Γένος CII. ΣΙΤΙΣΤΙΚΟΝ. Οἶκογ. τῶν Καρυοφυλλωδῶν. Jus.

1. Σ. Ἀπέταλον. W. Ἐπὶ τῶν παλαιῶν τῆς πώ-
λεως τειχῶν, εἰς τὰς πλατείας, καὶ τὰς ὁπωσούν σκιεράς
ὁδούς, ἀπανταχοῦ. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαρτίου μέχρι Μαΐου Ἀν-
θὴ ἀπέταλα. φυτὸν μικρότατον, τὸ ὅποιον καταπατεῖται
συνεχῶς, χωρὶς νὰ ὑποπίσῃ εἰς τὴν ἔρσιν. Φιλόζωον.

Γένος CIII. ΤΙΛΛΑΙΑ Οἶκογ. τῶν Ἀειζῶων.

1. Τ. Λειχνῶδης. W. Μεταξὺ τῶν λειχνῶν πρὸς
ἄρκτον τοῦ ὅρους τοῦ Αγ. Παντελεήμονος. Ἀνθεὶ ἀπὸ
Ιουνίου μέχρις Οκτωμβρίου. Ἀνθὴ ποώδη. Φυτὸν ἰσομέγεθες
μὲ τὸ Σιτιστικόν, περὶ τοῦ ὁποῖου ἐλαλίσσαμεν ἀνωτέρω. (α)

Κλάσις Ε'. Πεντανδρία (Φυτὰ Πεντασήμερα)

Τάξις Α'. Μονογυνία (Φυτὰ Μονόσπερα)

Γένος CIV. ΜΥΟΣΩΤΙΣ Βουγλωσσώδη. Jus.

1. Μ. Σκορπιοειδής. W. Ἐπὶ τὰς ἔχθρας τῶν
βοτανῶδων διωρύχων εἰς τὰς Στρατίας, καὶ ἐπὶ τῶν ἀπο-
τόμων θέσεων τοῦ ὅρους τοῦ Ἀβραμίου, κατέναντι τοῦ κή-
που τοῦ Κυρ. Βραχλιώτου. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις
Αἰγίου. Ἀνθὴ κυανὰ μὲ κίτρινον ὀμφαλόν. Ἐπέτειος.

2. Μ. Ἀρουραῖος. W. ΛΑΓΑΥΤΗΣ. Εἰς τοὺς ἀγρούς
τῆς Πλατυτέρας. Ἀνθεὶ ὡς ἀνωτέρω. Ἀνθὴ κρεατόχροα,
λευκόμυφαλα Ἐπέτειος.

(α) Ἐάν ὑπῆρχεν εἰς τὴν Νῆσον, καὶ ἀ σχετικῶς πρὸς τὸ κλίμα
καὶ τὸ ἔδαφος τῆς χωρὶς καλλιεργείας ἠδύνατο νὰ ἐπιδῶση φυόμενον, εἰς
τὴν τάξιν αὐτῆς τῆς Κλάσεως ἔπρεπε νὰ συγκαταταθῇ τὸ *Ilex Aquifolium*,
τὸ ὅποιον ἀναφέρει ὁ μακαρίτης Δρ Μιχαὴλ Πιέρης εἰς τὰ τρια-
κοντὰ τοῦ φυτὰ τῆς Κερκυραϊκῆς Χλωρίδος ἐκδόσεως τὸ 1814, Σελ.
21, μὲ τὸ συνώνυμον *Πρινάριον Ἀκανθόφυλλον*, καὶ τὸ ὅποιον
σημειώνει παρομοίως ὁ διαλεχθεὶς Δρ Βόττας εἰς τὴν Φυσικὴν καὶ Ιατρικὴν
Ἱστορίαν τῆς Νήσου Κερκύρας μὲ τὸ συνώνυμον *Πρινάρι* διὰ τοῦ ὁποῖου,
ὡς αὐτὸς βεβαίονει, τὸ διακρίνουσιν εἰς αὐτόχθονες. Ἰδὲ τὸ μνημονευθὲν
πύνημα, ἐκδοθὲν ἐν Μιλάνῳ 1823, Σελ. 20. Κρίνει ὁ Συγγραφεὺς χωρὶς
ῥέβον νὰ ἐμπέσῃ εἰς ἀμφιβολίαν ὅτι ἀμφότεροι ἐξέλαβον ὡς τοιοῦτον τὸ
Querce Leccio (*Quercus* *Ilex*. L) ἢ τὸ εἶδος *Q. Pseudo-coccifera* L.
ἐπειδὴ καὶ τὰ δύο εἶναι ὁμοιάτα μὲ τὸ *Aquifolium*, καὶ
εὐκόλως συγχέονται μὲ αὐτὸ, ὅταν παρατηρῶνται πρὸ τῆς ἐποχῆς τῆς
ἀνθηρορίας των

SPECIE

2. *M. Arvensis*. W. *Aragorns*. Ne' campi di Platiterra. Fiorisce come sopra, fiori color di carne con l'ombelico bianco. Annuale.

3. *M. Palustris*. Zannoni. Ne' terreni inondati del Lago Stavropotamo, e de' due Laghi di Sant' Onufrio. Fiorisce dal Marzo al Luglio, fiori cerulei. Vivace.

4. *M. P. Alba*. Varietà a fior bianco della specie precedente. Nasce gregariamente con essa e fiorisce nel tempo stesso.

5. *M. Commutata*. R. S. Sul Monte di Abramo. Annuale, Fiorisce come sopra, fiori cerulei con ombelico bianco.

6. *M. Intermedia*. Link. Ne' terreni selvatici di Caroccollo, e di Missostrati. Fiorisce da Giugno a Luglio. Fiori color di carne tendenti al Ceruleo. Annuo.

7. *M. Versicolor*. Roth. Sulle Macerie intorno alla Città. Fiorisce dal Marzo all'Aprile. Fiori cerulei con ombelico bianco. Annuale.

8. *M. Collina*. Ehr. Nelle siepi intorno alle vigne di Rodostamo a Castagnà. Fiorisce dal Febbrajo al Marzo. Fiori cerulei. Annuale.

9. *M. Echinospërma*. Nob. Pianta piccolissima, Cespitosa, molticaule, tutta rivestita di una lanugine irsuta, biancheggianti. Cauli medii eretti; laterali prostrati e resurgenti. Foglie radicali lungamente peziolate; cauline sub-sessili, opposte; Floralì sessili, amplessicaul, opposte pur anche, tutte Ellittiche. Corolle con tubo ventricoso, a lembo piano di un vago Ceruleo, con Umbilico croceo. Elegantissima specie, cui mancano i fiori il doppio più grandi, per essere ammessa tra le delizie di Flora. Nasce ne' siti erbosi incolti alle falde Occidentali del Monte di Santo Mattia. Fiorisce in Maggio. Annuale. L'Autore l'ha distinta col vocabolo specifico *Echinospërma* a motivo che i suoi semi sono altrettanti Gongili od aculei foliissimi e dritti, come nella specie unica del genere seguente, ma il doppio più lunghi, e più consistenti.

(Sarà continuato.)

3. M. Ελεῖος. Zan. Εἰς τὰς ἐπιφύτους γέας τῆς λίμνης τοῦ Σταυροποτάμου, καὶ τῶν δύο λιμνῶν τοῦ Αἰονοφρίου. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαρτίου μέχρις Ιουλίου Κυανανθής, Φιλίζως.

4. M. Λευκή. Ποικιλία τοῦ προηγουμένου εἴδους φέρουσα λευκὰ ἄνθη. Συμπαράφύεται καὶ συνανθεῖ μὲ αὐτὰ ταυτοχρόνως.

5. M. Ἀντηλλαγμένη. R. S. Ἐπὶ τοῦ ὅρου τοῦ Αβραμίου. Ἐπέτειος. Ἀνθεῖ ὡς ἀνωτέρω. Ἀνθη κυανὰ λευκόμφαλα.

6. M. Ἀνάμεσος. Link. Εἰς τὰς χέρσους τοῦ Καροχίου, καὶ Μισοκρατίου. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθη κρεατόχροα κυανοειδῆ. Ἐπέτειος.

7. M. Τρεψίχρος. Roth. Ἐπὶ των ἐρείσιων γύρωθεν τῆς Πόλεως. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαρτίου μέχρις Ἀπριλίου. Ἀνθη κυανὰ λευκόμφαλα.

8. M. Ἐπιλόφιος. Ehr. Εἰς τὰς ἐν Κασινίᾳ περὶ τὰς ἀμπέλους τοῦ Ροδοσάμου αἰμασίας. Ἀνθεῖ ἀπὸ Φεβρουαρίου μέχρι Μαρτίου. Κυανανθής. Ἐπέτειος.

9. M. Ἐχινόσπερος. Hm. Φυτόν μικροτάτου ἀναστάτος, πολυβλαστὲς, πολύκαυλον, δασύχουν, λευκίζον. Καυλοὶ μεσαῖοι ὀρθοφυεῖς, παρὰ πλευροὶ, ἐπίγειοι καὶ ἐπὶ ἀνιστάμενοι. Φύλλα, ριζικὰ μακρόμισχα, καυλικὰ ὑπάμισχα, παρὰλληλα. Ἀνθόφυλλα ἄμισχα, περιπτυξίκαυλα ὡσαύτως παρὰλληλα, ὅλα ἐλλειπτικά. Στεφάναι μὲ σωληνάς μεσογυλούς, λειοκράσπεδοι, καλλικύανοι, μὲ ὀμφαλὸν κροκώδη. Κομψότατον εἶδος, τοῦ ὁποίου λείπουνσι τὰ ἄνθη, διπλάσις μεγαλύτερα, διὰ τὰ εἰσχυρὰ εἰς τὰ ἐκλεκτὰ φυτὰ τοῦ Κήπου. Φύεται εἰς τοὺς ποώδεις καὶ ἀθεραπεύτους τόπους εἰς τοὺς δυτικούς πρόποδας τοῦ ὄρου τοῦ Αἰ. Ματθαίου. Ἀνθεῖ κατὰ Μαῖον. Ἐπέτειος. Ὁ Συγγραφεὺς τὴν διέκρισιν διὰ τοῦ εἰδικοῦ ὀνόματος Ἐχινόσπερος, ἐπειδὴ τὰ σπέρματά της εἶναι τόσα γογγυλίδια μὲ κέντρα σύμφυτα καὶ εὐθέα, καθὼς εἰς τὸ μόνον εἶδος τοῦ ἐπομένου Γένους, ἀλλὰ διπλάσιος μακρότερα καὶ διαρκέστερα.

(Ἡ Συνέχεια ἀκολουθεῖ.)